



RATICIDA EN BLOQUES ENCERADOS

talón[®]-B
RODENTICIDA



PROFESIONAL

ELIMINA RATAS Y RATONES CON LA PRIMERA INGESTA

ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD

Composición

Brodifacoum.....0,05 gr/ kg
Bitrex*.....0,01 gr/ kg
Derivados de cereales c.s.p.....999,94 gr/ kg

* Benzoato de Denatonium.

talón[®] es un poderoso raticida anticoagulante de segunda generación, de dosis única, que controla eficazmente lauchas, ratas del tejado y guarenes.

talón[®] controla a los roedores con la primera dosis que ingieren, equivalente a 1,3 gr. en ratas y 0,2 gr. en lauchas, y no produce rechazo al cebo, ya que la muerte de los roedores ocurre a partir del tercer día de la primera ingesta.

talón[®] contiene **Bitrex[®]**, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso y no siendo detectado por los roedores.

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
LISTO PARA USAR EN EXTERIOR O LUGARES HUMEDOS**

Uso Profesional y Doméstico

Contenido neto: 10 kg

Fabricado y envasado y en uso de licencia de Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., Brasil.
Importado y Distribuido por: Syngenta S.A.
Av. Vitacura 2939, Of. 201. Santiago, Chile, Teléfono: (2) 941 0100

Registro Instituto de Salud Pública (ISP): **P-469/07**

Consultas al Fono (2) 941 0100 ó productos.profesionales@syngenta.com

[®]: **Talón** es una marca registrada de Syngenta Limited.
BITREX[®] es marca registrada de Mac Farland Smith Ltda, Inglaterra.



RECOMENDACIONES DE USO:

talón® Bloques es un raticida listo para usar, especialmente indicado para el control de roedores en casas, bodegas, industrias, plantales animales y otros.

- Aplicar talón® tan pronto se observen las primeras señas de los roedores (ej. fecas, huellas, roeduras, etc).
- Utilizar el orificio central de los bloques para colgarlos o fijarlos (ej. Caja cebadora o tubo de PVC), en todos los lugares donde los roedores circulen, viven y alimenten, como por ej.: alcantarillas; canales de desagües; vigas; jardines; árboles; madrigueras; etc.
- En caso de nuevos roedores, repita la aplicación a los 7 ó 14 días.
- Para prevenir una nueva infestación, se recomienda mantener algunos puntos de cebo permanentes (puntos críticos).

El siguiente cuadro de recomendaciones debe ser considerado como una guía general.

Roedor	Infestación	
	Alta	Baja
Ratas	1 a 2 bloques cada 5 mts	1 a 2 bloques cada 10 mts
Ratones y lauchas	1 bloque cada 3 mts	1 bloque cada 6 mts

- Para interiores o ambientes secos, prefiera talón® Pellets.
- Complementar el uso de talón® con una correcta limpieza, aseo y desmalezado del lugar.

Grupo químico: Hidroxicumarina.

Precauciones de Seguridad

- Conservar talón® en su envase original.
- Usar guantes para su manipulación.
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Enterrar o eliminar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido.
- Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.
- Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no responsables.
- Mantener fuera del alcance de aves y animales.
- No almacenar junto con alimentos.
- En caso de intoxicación acuda a un médico.

**Primeros Auxilios**

- En caso de ingestión, **NO** provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico **CITUC al fono: (2) 635 3800**, las 24 horas.
- Mantener al afectado abrigado y en reposo Si el afectado está inconsciente, no administrar nada por boca y mantenerlo acostado de lado.

ANTIDOTO

- Monitoreo de Tiempo de Protrombina (TP) a las 24, 48 y 72 horas. En caso de elevación de Tiempo Protrombina, administrar **Vitamina K 1 (Fitomenadiona oral o inyectable. Adultos 40 mg x día y Niños menores de 12 años 20 mg x día, ambos en varias dosis.**

-
- **ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER TODA LA ETIQUETA.**
 - **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y/O PERSONAS NO RESPONSABLES.**
 - **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE AVES Y ANIMALES.**
 - **EN CASO DE INTOXICACIÓN, MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**
-

En caso de **INTOXICACION**, llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): ☎ (2) 635 3800.
- Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): ☎ (2) 941 0100, Santiago - Chile.

